

Recomendaciones de vacunas en adultos

Vacuna	17-45 años	45-64 años	> 65 años
Doble Adulto (dT)	1 dosis c/10 años		
Triple acelular (dTpa)	1 dosis en reemplazo de uno de los refuerzos de dT		
Antigripal	1 dosis IM		1 dosis
Antineumocócica polisacárida 23 serotipos	1 o 2 dosis (a los 5 años)		1 dosis
Antineumococcica conjugada de 13 serotipos ⁽¹⁾		1 dosis a mayores de 50 años (*)	
Vacuna Herpes Zoster		1 dosis a mayores de 50 años (**)	
Hepatitis B	3 dosis (0, 1, 6 meses)		
Hepatitis A	2 dosis (0, 6 meses)		
Antimeningocócica	Según vacuna utilizada		
Contra la fiebre amarilla	1 dosis, refuerzo a los diez años		No aplicar en mayores de 60 años
Contra Fiebre Hemorrágica	1 única dosis a partir de los 15 años		

(*) Aprobación regulatoria (ANMAT), ACIP recomienda su aplicación a partir de los 65 años en esquema secuencial con vacuna polisacárida de 23 serotipos

(**) Aprobación regulatoria (ANMAT)

A todo el grupo etario	Sólo si hay indicación	No administrar	En zonas geográficas de riesgo
------------------------	------------------------	----------------	--------------------------------

Indicaciones de vacuna antigripal

- Adultos mayores de 65 años.
- Adolescentes en terapia crónica con aspirina.
- Embarazadas en época de influenza.
- Puérperas hasta los seis meses del nacimiento del niño.
- Enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares (asma, enfermedad fibroquística, EPOC, enfisema, bronquiectasias, etc.), metabólicas, hematológicas, hepáticas o renales, más allá de la edad.
- Inmunosuprimidos: Inmunosupresión congénita o producida por enfermedad de base, como infección por VIH, tratamiento quimioterápico o corticoides (dosis mayor de 2 mg/kg/día de metilprednisona, o su equivalente, por más de catorce días), o por trasplante de células hematopoyéticas u órgano sólido, o por cualquier otra causa que produzca déficit de inmunidad.
- Obesidad mórbida.
- Situaciones que comprometan la función respiratoria, el manejo de secreciones, o que aumenten el riesgo de aspiración.
- Residentes de institutos de rehabilitación o geriátricos.
- Personal de la salud.
- Contactos sanos de pacientes en riesgo.

Indicaciones de vacuna antineumocócica polisacárida 23 serotipos

- Mayores de 65 años.

- Enfermedad pulmonar crónica (incluso asma)
- Enfermedad cardiovascular crónica.
- Anemia drepanocítica.
- Síndrome nefrótico.
- Asplenia funcional o anatómica.
- Neoplasias hematológicas.
- Implantes cocleares.
- Insuficiencia renal crónica.
- Infección por VIH-SIDA.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Trasplante de médula ósea.
- Hepatopatías crónicas.
- Tratamiento con corticosteroides.
- Alcoholismo.
- Diabetes.
- Tabaquismo.

Se administrará una segunda dosis cinco a los 5 años de la primera en las siguientes situaciones:

- Asplenia funcional o anatómica.
- Inmunosupresión.
- Trasplante de órgano sólido o células hematopoyéticas.
- Insuficiencia renal crónica.
- Síndrome nefrótico.
- Personas que hubieran recibido la primera dosis antes de los 65 años.

Indicaciones de vacuna antineumocócica conjugada 13 serotipos ⁽¹⁾

- Mayores de 50 años ⁽¹⁾
- Implantes cocleares ⁽²⁾
- Fístula de LCR ⁽²⁾
- Inmunosuprimidos (ver módulo 1 y 3) ⁽²⁾
- Personas \geq 65 años ⁽³⁾

⁽¹⁾ Aprobada por entes reguladores por en base a estudios de inmunogenicidad,

⁽²⁾ Esquema secuencial con vacuna polisacárida 23 serotipos (ver módulo 3), recomendación de ACIP, SADI y CoNaIn ⁽¹⁾

⁽³⁾ Recomendación ACIP con esquema secuencial

Población con alto riesgo de adquisición de hepatitis B

- Trabajadores de la salud
- Hemodializados.
- Politransfundidos.
- Personas privadas de la libertad y personal de cárceles.
- Hombres que tienen sexo con hombres.
- Heterosexuales con relaciones no monogámicas.
- Usuarios de drogas endovenosas.
- Infección por VIH/SIDA.
- Hepatopatías crónicas
- Viajeros a países de alta endemicidad.
- Convivientes y parejas de portadores de hepatitis B.

Indicaciones de vacuna antihepatítica A

- Viajeros a zonas de alta o mediana endemia.
- Hombres que tienen sexo con hombres.
- Usuarios de drogas.
- Desórdenes de la coagulación.
- Enfermedad hepática crónica.
- Riesgo ocupacional:
 - Personal de laboratorio que trabaja con el virus o con primates infectados con VHA.
 - Personal gastronómico.
 - Personal de jardines maternos.
 - Trabajadores de sistemas sanitarios (por ej.: cloacas)